

Anschrift des Verfassers:

Dr. Tobias Grüme
Zur Dormhiede 81
48161 Münster
Mail: tgrueme@web.de

Die amerikanische Baldachinspinne *Eperigone trilobata* (EMERTON, 1882) breitet sich in Europa aus

Martin Kreuels, Münster

Wahrscheinlich in den 1970er Jahren wurde die Baldachinspinne *Eperigone trilobata* nach Deutschland eingeführt. DUMPERT & PLATEN (1985) gelang der erste Nachweis für Deutschland 1976 in einem Buchenwald bei Eitlingen in der Nähe von Karlsruhe. Seit dem breitet sich die Spinne in Europa aus. Nachweise in Richtung Süden liegen von HÄNGGI (1990) für die Schweiz, von BREUSS (1999) für Österreich (nachgewiesen 1998) und von ZINGERLE (2000) und HANSEN (2003) für Italien vor. Auch in Richtung Westen liegen Nachweise vor: BLICK (1995) konnte die Linyphiidae 1994 in Frankreich nahe der deutschen Grenze bei Weil am Rhein nachweisen, LAM-BRECHTS (2003) in Belgien und der Autor hat zehn Männchen in den Jahren 2003 und 2005 für Luxemburg nachgewiesen. Es bleibt abzuwarten ob diese Art in den kommenden Jahren auch im Norden zu finden sein wird.



Abb. 1: Pedipalpus des Männchens von *Eperigone trilobata* (EMERTON, 1882)




Abb. 2: Epigyne des Weibchens von *Eperigone trilobata* (EMERTON, 1882)